



Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Gäller från 2018-07-05
Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se	Revideras 2020-07-05

Riktlinjer gällande PICC -line

PICC-line (perifer inläggning av central venkateter) är en tunn silikonkateter som läggs in i ett blodkärl i överarmen och ligger med spetsen centralt i vena cava superior.

Målgrupp

Målgrupp för PICC-line är vanligen patienter som behöver en venväg som tillåter infusion av vävnadsretande/kärlväggsretande vätskor (exempelvis antibiotika, cytostatika, parenteral nutrition).

Indikation för PICC-line

- Långvarigt behov av intravenös terapi
- Behandling med t ex antibiotika, cytostatika (cellgifter) och näringslösning.

PICC-line sätts alltid på läkarordination och läggs in av särskilt utbildad sjuksköterska inom slutenvården.

Utbildning

Vid utbildningsbehov i handhavande av PICC-line kan verksamheten ta kontakt med ASIH.

När en boende kommer till ett boende med PICC-line ska följande information medfölja:

- Datum då PICC-line är insatt samt på vilka indikationer
- Vilket sjukhus/klinik som genomförde ingreppet
- Kontaktperson och telefonnummer till klinik där PICC är insatt
- Kateterns externa längd
- Tidigare komplikationer kopplat till PICC-line
- Omläggningsfrekvens

Omläggning av PICC-line

PICC-line skall läggas om en gång per vecka, tätare vid behov.

Material som behövs för omläggning och skötsel av PICC-line

- undersökningshandskar
- plastförkläde
- omläggningsset
- suturtejp (korta)
- sprutor 10-20 ml (mindre än 10 ml sprutor får ej användas)
- NaCl inj.vätska 9mg/ml
- Klorhexidinsprit 5mg/ml
- Statlock fixeringsplatta
- transparent semipermeabelt förband
- steril Injektionsventil
- sterila kompresser
- limborttagningskompresser
- hudskyddsbarriär
- skyddsstrumpa

För mer info angående handhavande samt omläggning av PICC-line:

<http://www.vardhandboken.se/Texter/PICC-line/Omlaggnig/>